

Prevenga el Cáncer Cervical con la Prueba Adecuada en el Momento Adecuado



¿Sin seguro? Podría obtener las pruebas de forma gratuita a través de la Conexión de Salud para Mujeres. Llame al 1-877-385-2345 para más información.



Las pruebas de detección pueden detectar células anormales para que puedan ser tratadas antes de que se conviertan en cáncer.

La prueba de Papanicolaou detecta cambios en las células del cuello uterino que podrían convertirse en cáncer si no se tratan.

La prueba del virus del papiloma humano (VPH) busca el virus que causa estos cambios en las células.

VPH es la causa principal del cáncer de cuello uterino



El VPH es un virus muy común, transmitido de una persona a otra durante las relaciones sexuales. La mayoría de las personas lo contraen, pero por lo general desaparece por sí solo. Si no desaparece, puede causar cáncer.

La vacuna contra el VPH se aplica en una serie de 3 dosis y es recomendada para niños y niñas entre 11-12 años de edad, y disponible hasta los 26 años de edad.

La mayoría de las mujeres no necesitan una prueba de Papanicolaou cada año.

Hágase su primera prueba de Papanicolaou a los 21 años. Si sus resultados son normales se puede esperar 3 años para su próxima prueba de Papanicolaou.

Pruebas del VPH no se recomiendan para las mujeres menores de 30 años.



Cuando cumple 30 años tiene una opción:

Si los resultados de las pruebas son normales hágase una prueba de Papanicolaou cada 3 años

O hágase un doble examen - tanto una prueba de Papanicolaou y una prueba de VPH - cada 5 años.

La mayoría de las mujeres pueden dejar de hacerse la prueba para el cáncer de cuello de útero una vez que son mayores de 65 años. Hable con su médico acerca de cuándo puede parar.

Registro de Exámenes

Fecha	Edad	Tipo de Prueba	Resultados	Siguiente prueba necesaria
/ /		Pap / Co-test		/ /
/ /		Pap / Co-test		/ /
/ /		Pap / Co-test		/ /
/ /		Pap / Co-test		/ /
/ /		Pap / Co-test		/ /
/ /		Pap / Co-test		/ /
/ /		Pap / Co-test		/ /